

Acard 75 mg x 60 tabl



Cena: 9,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny od ręki
Opakowanie	60 tabl
Postać	Tabletki
Producent	POLFA WARSZAWA
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Wstęp

Acard 75 mg to lek w formie tabletek w kształcie serca, przeznaczony do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w sytuacji chorób, które stanowią ryzyko powstania zakrzepów oraz zatorów w naczyniach krwionośnych. Lek podawany jest pacjentom m.in. w celu zapobiegania zawałowi serca u osób dużego ryzyka, w niestabilnej chorobie wieńcowej, świeżym zawałowi serca lub podejrzeniu zawału serca. **Acard 75 mg** można podawać także pacjentom po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, w tym m.in. po plastyce naczyń wieńcowych.

Lek Acard 75 mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi. Co ważne, specjalnie opracowana konstrukcja otoczki leku **Acard 75 mg** sprawia, że tabletki rozpadają się dopiero w jelicie cienkim, przez co chroni śluzówkę żołądka oraz dwunastnicy przed podrażnieniami. Jedno opakowanie leku **Acard 75 mg** zawiera 60 tabletek.

Skład

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletki zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna uwodniona, kwas metakrylowy i etyl akrylanu kopolimer (1:1), trietyl cytrynian, talk, emulsja antypienna.

Wskazania i działanie

Acard 75 mg to lek dostępny w aptece bez recepty, który można stosować długotrwale w celu profilaktyki chorób, którym może towarzyszyć powstanie zatoru oraz zakrzepów w naczyniach krwionośnych. W każdej tabletki zawarte jest 75 mg kwasu acetylosalicylowego, który hamuje zlepianie się płytek krwi, przez co chroni przed powstaniem zatorów i zakrzepów.

Lek Acard 75 mg stosowany jest w następujących sytuacjach:

- choroba niedokrwienna serca;
- zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
- w niestabilnej chorobie wieńcowej;
- u osób po przebytym już zawałowi;

- stan po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych oraz plastyce narządów wieńcowych;
- zapobieganie zatorom naczyń mózgowych u osób z migotaniem przedsionków;
- u osób po przebytych udarach zatorowym mózgu oraz z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
- zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
- zapobieganie zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Dawkowanie

Acard 75 mg to lek, który należy stosować doustnie zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku **Acard 75 mg** należy zasięgnąć porady lekarza, który dobierze dawkę leku odpowiednią dla pacjenta oraz określi czas trwania terapii.

Zalecane dawkowanie: 1 tabletkę (75 mg kwasu acetylosalicylowego) dziennie. Tabletki należy przyjmować po posiłku, w całości, popijając je niewielką ilością wody. Tabletkę **Acard 75 mg** ma specjalną otoczkę, która nie rozpada się w żołądku, przez co ogranicza działanie drażniące kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Dawkowanie w świeżym zawałe lub w sytuacji podejrzenia świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki **Acard 75 mg** (300 mg kwasu acetylosalicylowego). Tabletki należy dokładnie rozgryźć, co przyspieszy ich wchłanianie. Co ważne, w ostrym zawałe serca lub podejrzeniu zawału tabletki mogą być stosowane, gdy kwas acetylosalicylowy nie jest dostępny w tabletkach niepowlekanych. Jeżeli potrzebne jest zastosowanie większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza, a w przypadku ciężkiego zatrucia zgłosić do szpitala.

Przeciwwskazania

Lek **Acard 75 mg** nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

- uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- zwiększona skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
- choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy;
- poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek, wątroby);
- stosowanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
- III trymestr ciąży;
- jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech);

dzieci poniżej 12. roku życia z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye'a).

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.