

Acidolac junior x 20 misio-tablet o smaku truskawkowym



Cena: 19,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny w aptece w 24h
Opakowanie	20 tabl
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus

Opis produktu

Składniki

substancja słodząca - maltitol, olej palmowy, odtłuszczone mleko w proszku, fruktooligosacharydy (FOS), aromat truskawkowy, emulgator - lecytyny, liofilizowany szczep bakterii *Lactobacillus acidophilus* NCFM®, liofilizowany szczep bakterii *Bifidobacterium lactis* HN019™, przeciwutleniacze - mieszanina tokoferoli, palmitynian askorbylu .

2 misio-tabletki zawierają łącznie 4 mld liofilizowanych szczepów bakterii *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum* oraz fruktooligosacharydy.

Masa netto

Masa netto: 56 g (20 x 2,8 g)

Opakowanie zawiera: 20 tabletek.

Charakterystyka

Acidolac junior jest preparatem zawierającym dwa probiotyczne szczepy bakterii mlekowych *Lactobacillus acidophilus* i *Bifidobacterium bifidum* oraz prebiotyki - fruktooligosacharydy (FOS).

- Połączenie probiotyków z prebiotykiem wydłuża czas życia bakterii probiotycznych i ułatwia kolonizację jelita. Probiotyki wchodzące w skład preparatu Acidolac junior pomagają w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę, chroniącą przed rozwojem niekorzystnej mikroflory.
- Przeznaczony do postępowania dietetycznego: w stanach zaburzenia równowagi flory bakteryjnej przewodu pokarmowego powstałej w trakcie i po antybiotykoterapii, w przebiegu biegunek (zwłaszcza infekcyjnych) oraz w trakcie podróży do innych stref klimatycznych, kiedy w przewodzie pokarmowym dochodzi do zmian w składzie mikroflory.

Przeciwwskazania

Należy zachować ostrożność stosując u dzieci z zaburzeniami odporności lub wrodzoną wadą serca. Zawiera substancję słodzącą; spożycie w nadmiernej ilości może mieć efekt przeczyszczający. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek

składnik produktu, w nietolerancji fruktozy lub niedoborze izomaltazy.

Stosowanie

Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli: 1 tabletkę dwa razy dziennie w trakcie kuracji antybiotykowej oraz 2 - 3 tygodnie po jej zakończeniu lub indywidualnie według wskazań lekarza.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C. W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

Anlit Ltd Advanced Nutrition Supplements

dla:

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz

ul. Władysława Łokietka 10

Ważne informacje

Produkt nie zawiera glutenu. Produkt nie zawiera sacharozy.

Informacje dodatkowe

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.