

Acidolit bezsmakowy dla niemowląt x 10 sasz po 4,4g



Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny od ręki
Opakowanie	10 sasz
Postać	Proszki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

Opis produktu

Składniki

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu.

100 ml roztworu:

sód 60 mmol/litr,
chlorki 50 mmol/litr,
glukoza 85 mmol/litr,
potas 20 mmol/litr,
cytrynian 10 mmol/litr.
Osmolarność 225 mOsm/l

Masa netto

Opakowanie zawiera 10 saszetek po 4.4g.
Masa netto: 44 g.

Charakterystyka

- Wspomagająco w stanach zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w sytuacjach, w których istnieje ryzyko odwodnienia w celu nawadniania oraz uzupełnienia składników mineralnych w organizmie zarówno podczas wymiotów jak i biegunki.
- Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności i obniżonej zawartości sodu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Stosowanie

Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczkiem. Roztworu nie należy dosładzać. Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Nawadnianie: (pierwsze 3-4 godziny nawadniania):

- zalecana dawka płynu nawadniającego: ok. 50-100ml na każdy kilogram masy ciała podane w ciągu 3-4 godzin.

Nawadnianie podtrzymujące: (dalsze nawadnianie, po pierwszych 3-4 godzinach):

- zalecana dawka płynu nawadniającego: po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10ml na każdy kilogram masy ciała.

Jeżeli w trakcie pierwszych 3-4 godzin występują wymioty lub biegunkowe stolce to podawać płyn dodatkowo:

- po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10ml na każdy kilogram masy ciała.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

Z.F. POLPHARMA S.A.
ul. Pełplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Informacje dodatkowe

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.