

Ambroxol 123ratio 3 mg/ml roztwór doustny 100 ml

Cena: 6,10 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	100 ml
Postać	Płyny doustne
Producent	TEVA
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ambroxolum

Opis produktu

Skład

- **Substancją czynną** leku jest ambroksolu chlorowodorek. Każdy ml roztworu doustnego zawiera 3 mg ambroksolu chlorowodorku.
- **Inne składniki leku to:** acesulfam potasowy (E 950), kwas benzoesowy (E 210), glicerol 85% (E 422), hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, sorbitol ciekły, niekryształizujący (E 420), aromat malinowy, aromat waniliowy i woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Ambroxol 123ratio zawiera jako substancję czynną ambroksolu chlorowodorek. Należy on do grupy leków mukolitycznych, pomagających oczyścić drogi oddechowe z nadmiernej ilości śluzu.

Ambroxol 123ratio jest stosowany w leczeniu chorób dróg oddechowych, wymagających usuwania śluzu (plwociny) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Lek rozrzedza śluz ułatwiając jego usunięcie.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo przez 2 do 3 dni należy stosować 10 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml 3 razy na dobę (co 8 godzin), co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę. Następnie należy stosować 10 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml dwa razy na dobę (co 12 godzin), co odpowiada 60 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

2,5 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml 3 razy na dobę (co 8 godzin), co odpowiada 22,5 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:

5 ml leku Ambroxol 123ratio, 3 mg/ml 2 do 3 razy na dobę (co 12 lub 8 godzin), co odpowiada 30- 45 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę.

Ambroxol 123ratio należy przyjmować po posiłku, korzystając z załączonego dozownika (strzykawka doustna). Zalecane jest wypicie szklanki wody po podaniu leku i picie dużej ilości płynów w ciągu dnia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli po 5 dniach stosowania leku nie następuje poprawa lub objawy nasilają się (po 3 dniach u dzieci w wieku poniżej 6 lat).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ambroxol 123ratio

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowoderek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambroxol 123ratio
- u dzieci w wieku do 2 lat
- jeśli pacjent ma dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji fruktozy

Ciąża i karmienie piersią:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie obserwowano szkodliwego działania w okresie ciąży. Jednak, stosowanie w okresie ciąży nie jest zalecane, w szczególności w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Stosowanie leku Ambroxol 123ratio nie jest zalecane podczas karmienia piersią, jednak nie należy się spodziewać szkodliwego niepożądanego wpływu na dzieci karmione piersią.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.