

## Apap 500 mg x 50 tabl powlekanych



Cena: 18,18 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	50 tabl powlekanych
Postać	Tabletki
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Paracetamol

### Opis produktu

#### Wstęp

**Apap 500 mg** to preparat leczniczy, którego substancją czynną jest paracetamol (1 tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu). Jest to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który wykazuje dużą skuteczność w leczeniu bólów różnego pochodzenia, w tym m.in. bólu głowy, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólu mięśni, bólów kostno-stawowych, bólu gardła, nerwobólu, a także gorączki towarzyszącej przeziębieniu lub grypie. **Apap lek** wskazany jest do stosowania zarówno u dorosłych, jak również u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Jedno opakowanie zawiera 50 sztuk podłużnych tabletek powlekanych w kolorze białym.

#### Skład

- Substancja czynna: paracetamol (Paracetamolum). 1 tabletkę powlekana zawiera 500 mg paracetamolu.
- Substancje pomocnicze: wosk Carnauba, hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.

#### Wskazania i działanie

**Lek Apap** to produkt, którego substancją czynną jest paracetamol, odpowiedzialny za uśmierzanie bólu oraz obniżanie gorączki. Działanie leku związane jest z hamowaniem aktywności ośrodkowej cyklooksygenazy, która decyduje o powstawaniu czynników odpowiedzialnych za podnoszenie temperatury ciała oraz pobudzenie receptorów bólowych. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego i nie zmniejsza syntezy prostaglandyn na obwodzie, dlatego też (w odróżnieniu od leków z grupy NLPZ) nie podrażnia błony śluzowej żołądka i nie zaburza procesów krzepnięcia krwi.

Wskazaniem do stosowania **leku Apap** są dolegliwości bólowe różnego pochodzenia, w tym:

- ból głowy (w tym napięciowy i migrenowy ból głowy);
- ból zębów;
- bóle mięśni;
- bóle kostno-stawowe;
- ból gardła;

- nerwobóle.

Preparat można stosować także w przypadku gorączki towarzyszącej przeziębieniu lub grypie. **Lek Apap** może być bezpiecznie stosowany w ciąży.

#### Dawkowanie

**Lek Apap** należy zawsze przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, bądź zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Preparat należy zawsze przyjmować doustnie. Jego działanie można przyspieszyć poprzez przyjmowanie go na czczo. Co ważne, w przypadku gdy dolegliwości bólowe nie ustępują po 5 dniach, a gorączka nie obniża się po 3 dniach, dalsze leczenie należy zawsze konsultować z lekarzem.

**Dorośli:** od 1 do 2 tabletek powlekanych (500-1000 mg paracetamolu) na dobę. Jeżeli jest to konieczne, podaną dawkę można powtórzyć po co najmniej 4 godzinach do 3 lub 4 razy na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki leku Apap, która wynosi 8 tabletek powlekanych w ciągu doby (4 g paracetamolu).

**Młodzież w wieku powyżej 12 lat:** 1 tabletkę powlekaną w ciągu doby (500 mg paracetamolu). Jeżeli jest to konieczne, dawkę można powtórzyć po co najmniej 4 godzinach od 3 do 4 razy na dobę.

#### Przeciwwskazania

**Lek Apap** nie powinien być stosowany w sytuacji, gdy:

- wcześniej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub każdy inny składnik leku;
- u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek;
- stosowane są inhibitory MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu;
- u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej;
- u dzieci w wieku powyżej 12 lat.

#### Działania niepożądane

**Lek Apap** może powodować szereg działań niepożądanych, które nie muszą występować u każdego pacjenta. Zalicza się do nich m.in.:


- działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): nadwrażliwość, rumień, pokrzywka, wysypka, nudności, wymioty, problemy z trawieniem;
- działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): trombocytopenia, agranulocytoza, skurcz oskrzeli, ostre uszkodzenie wątroby spowodowane przedawkowaniem leku, plamica barwnikowa.

#### Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).

Galeria



**SPRAWDZONY NA RÓŻNE BÓLE**

- głowy
- menstruacyjny
- mięśni,
- gorączka
- kostno-stawowy
- na ból i gorączkę po szczepieniu np. przeciw COVID-19

**MOŻE BYĆ STOSOWANY PRZEZ OSOBY:**

- z chorobami kardiologicznymi
- z chorobami gastrycznymi\*
- kobiety w ciąży
- 12+ lat
- Nie uzależnia
- Nie zaburza koncentracji\*\*

\* np. wrzody żołądka, reflaks, choroby zapalne jelit  
\*\* Nie wykryto na zbilansowanej próbie jazdy i obsługi maszyn.

**APAP®** Wyjątkowa\* tabletkę z paracetamolem

- Łatwa do połknięcia
- Uwalnia się szybko w 3 min\*\*
- 1 lub 2 tabletki jednorazowo
- Unikalna technologia maskuje nieprzyjemny smak paracetamolu

\*Mata, powłokowa i wodorotlenowa (co zapewnia maskowanie nieprzyjemnego smaku paracetamolu oraz ułatwia połknięcie) tabletki wyjątkowej z paracetamolem. Dostępnych na rynku polskim bez recepty na dzień 30.04.2021r. Dodatkowo uwalnia się w 3 minuty - rozpoczęcie uwalniania APAP w szorstkim soku jabłkowym o pH 1,2, temperaturze 37°C. Badania wewnętrzne, Wrocław, 06.2019r.  
\*\* Rozpoczęcie uwalniania APAP w szorstkim soku jabłkowym o pH 1,2, temp. 37 st. Dane wewnętrzne, Wrocław, 06.2019r.

