

## Claritine allergy 10 mg x 7 tabl



Cena: 12,35 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	wysyłamy od ręki
Opakowanie	7 tabl
Postać	Tabletki
Producent	BAYER
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Loratadinum

### Opis produktu

#### Skład

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny.

#### Wskazania i działanie

- Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
- Trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokujący wybiórczo obwodowe receptory H1. Charakteryzuje się silnym działaniem, które pojawia się już po 10-30 min i utrzymuje do 24 h. Praktycznie nie wykazuje ośrodkowego działania sedatywnego i cholinolitycznego, ani nie wpływa na receptory H2. Szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego oraz podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem CYP 3A4 i CYP 2D6. Główny metabolit - desloratadyna - jest czynny farmakologicznie. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%; desloratadyna w 73-76%. Lek jest wydalany w ciągu 10 dni z moczem i kałem, głównie w postaci metabolitów. **T<sub>0,5</sub>** loratadyny we krwi wynosi 3-20 h, desloratadyny 9-92 h.

#### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabl.) raz na dobę. Dzieci 2-12 r.ż.: dzieci o m.c. powyżej 30 kg - 10 mg (1 tabl.) raz na dobę. W ciężkiej niewydolności wątroby u dorosłych i dzieci podaje się mniejszą dawkę początkową, a następnie dawkę normalną co 2. dzień. Należy przerwać stosowanie leku na około 48 h przed planowanym wykonaniem testów skórnych.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na loratadynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciąża. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci poniżej 2 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Nie stosować w ciąży. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

#### Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).