

## Clotrimazolum 1% krem 20 g (Glaxo)



Cena: 5,95 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	20 g
Postać	Kremy
Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	Lek

### Opis produktu

#### Wstęp

**Lek Clotrimazolum w postaci kremu** jest produktem działającym przeciwgrzybiczo, którego składnikiem czynnym jest klotrymazol, czyli pochodna imidazolu. Po aplikacji na skórę substancja czynna kremu wnika do naskórka, gdzie hamuje wzrost oraz podziały komórkowe grzybów, a dodatkowo prowadzi do ograniczenia czynności ich błon komórkowych. **Na co jest krem Clotrimazolum? Wskazaniem** do stosowania leku jest miejscowe leczenie grzybicy skóry rąk i stóp, a jeśli do infekcji przyczyniają się dermatofity, to także grzybicy tułowia, nóg i podudzi, a także leczenie łupieżu pstrego. **Lek Clotrimazolum** może być stosowany również do leczenia infekcji skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych. Można go zatem wykorzystać do infekcji drożdżakowych napletka i żołądki, a także warg sromowych. **Funkcją leku Clotrimazolum** jest zabijanie grzybów, co jest szczególnie skuteczne w stosunku do drożdżaków i dermatofitów.

W opakowaniu znajduje się 20 g **leku Clotrimazolum**. W skład 1 g leku wchodzi 10 mg klotrymazolu oraz składniki pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek Clotrimazolum, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, gdzie przedstawiono między innymi zalecane **dawkowanie Clotrimazolum**. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać dawkowania leku określonego w ulotce. Zaleca się nakładanie cienkiej warstwy kremu na zmienione chorobowo obszary ciała w częstotliwości 2–3 razy. Jednocześnie **lekiem Clotrimazolum** powinny być leczone wszystkie obszary objęte procesem chorobowym. Terapia lekiem przeciwgrzybiczym **Clotrimazolum** powinna trwać około 2–4 tygodnie, nawet jeśli objawy pacjenta ustąpią nieco wcześniej. Nie należy przerywać jej zbyt wcześnie, gdyż grozi to nawrotem zakażenia. Jeśli pacjent będzie przyjmował lek przez 7 dni, a jego objawy nie ustąpią lub nasilą się, powinien skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować dawek leku większych od wskazanych.

W czasie stosowania **leku Clotrimazolum** mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta się one pojawiają. **Lek Clotrimazolum** z nieznaną częstotliwością powoduje reakcje uczuleniowe, do których można zaliczyć między innymi pokrzywkę, omdlenie, spadek ciśnienia krwi, a także duszności. Inne możliwe skutki uboczne **leku Clotrimazolum** to wysypka i pieczenie, a także świąd i uczucie dyskomfortu bądź bólu. Lek może też powodować kłucie, obrzęk lub pęcherze, poza tym może przyczyniać się do powstania podrażnienia lub rumienia. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiegokolwiek objawy niepożądane **leku Clotrimazolum**, powinien skonsultować się z lekarzem.

**Lek Clotrimazolum** ma **przeciwwskazania** do stosowania. Nie należy z niego korzystać, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na jego składniki czynne lub pomocnicze. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią również nie powinny stosować **Clotrimazolum**. **Lek** nie powinien być połykany ani mieć kontaktu z oczami. Poza tym produkt leczniczy może mieć niekorzystny wpływ na mechaniczne środki antykoncepcyjne, które są wykonane z lateksu.

## Skład

1 g kremu Clotrimazolum zawiera:

- substancję czynną: klotrymazol (Clotrimazolum) 10 mg,
- substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, olbrot syntetyczny, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

## Wskazania i działanie

Clotrimazolum to lek przeciwgrzybiczy w formie kremu, który dostępny jest w aptekach bez recepty. Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego wyłącznie w obrębie skóry zmienionej chorobowo. Substancja czynna, klotrymazol, wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe – zabija większość grzybów, które wywołują zakażenia. Po aplikacji krem Clotrimazolum wnika do naskórka, a następnie hamuje wzrost i podział komórek grzybów, a także ogranicza czynność błon komórkowych drobnoustrojów. Preparat działa głównie na drożdżaki i dermatofity.

Lek Clotrimazolum jest wskazany do stosowania w przypadku:

- grzybicy skóry: dłoni i stóp, tułowia, nóg i podudzi, które wywołane są przez następujące dermatofity: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum* i *Microsporum canis*;
- łupieżu pstrego, który wywołany jest przez *Malassezia furfur* (*Pityrosporum orbiculare* lub *Pityrosporum ovale*);
- zakażeń drożdżkowych skóry oraz błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych, napletka lub żołądź), które wywołane są przez *Candida vulvitis* lub *Candida balanitis*.

## Dawkowanie

Lek Clotrimazolum stosowany jest miejscowo na skórę, na którą aplikujemy cienką warstwę kremu. Zalecana dawka wynosi 2 lub 3 warstwy preparatu na dobę. Lek Clotrimazolum należy stosować równocześnie na wszystkie zakażone partie ciała przez okres od 2 do 4 tygodni, nawet wtedy, gdy objawy choroby ustąpią. W przeciwnym wypadku może dojść do nawrotu choroby. Jeśli objawy grzybicy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach od rozpoczęcia stosowania leku Clotrimazolum, zaleca się ponowną kontrolę u lekarza.

Lek Clotrimazolum należy zawsze stosować na czystą i suchą skórę. Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować na rany oraz uszkodzoną skórę. Jak do tej pory nie zostały odnotowane przypadki przedawkowania leku Clotrimazolum, pod warunkiem, że jest on stosowany zgodnie ze wskazaniami, a także zalecanym sposobem użycia i dawkowaniem.

## Przeciwwskazania

Lek Clotrimazolum nie powinien być stosowany u osób, u których: występuje nadwrażliwość na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

- są w okresie ciąży;
- są w trakcie laktacji.

Co ważne, klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe narządów płciowych może niekorzystnie wpływać na mechaniczne środki antykoncepcyjne z lateksu, a także osłabiać ich skuteczność.

## Działania niepożądane

Lek Clotrimazolum może powodować objawy miejscowego podrażnienia skóry. Jeśli objawy te nasilają się lub nie ustępują po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania preparatu leczniczego.

## Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).