

Dolphiner preparat do uszu po pływaniu 15 ml

Cena: 18,05 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozole
Producent	AXFARM
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Skład

Substancje czynne: alkohol izopropylowy, gliceryna, kwas octowy, olejek z mięty pieprzowej.

Wskazania i działanie

- Izopropanol - osusza przewód słuchowy z wody, przyspieszając jej parowanie.
- Kwas octowy - przywraca fizjologiczne naturalne pH 5,5 ucha, zapobiegając infekcjom wywołanym przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas) często występującą w wodzie.
- Mięta - zapewnia świeżość i szybko niweluje przykry zapach kwasu octowego.
- Gliceryna - wysięcia przewód słuchowy i pielęgnuje go.

Preparat osuszająco-zakwaszający o właściwościach profilaktycznych i jednocześnie pielęgnacyjnych stworzony z myślą o osobach wyjeżdżających na wakacje nad wodę, korzystających z basenów, aktywnie pływających i uprawiających inne sporty wodne, a więc bezpośrednio narażonych na działanie Pseudomonas.

Dawkowanie

Zalecane użycia to 1-2 aplikacje (1 aplikacja to 1 naciśnięcie aplikatora) do każdego ucha bezpośrednio po kąpiel, prysznicu, pływaniu, uprawianiu sportów wodnych w celu profilaktyki zapaleń przewodu słuchowego zewnętrznego, związanych z gromadzeniem się nadmiaru wody w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

- Przed aplikacją, preparat należy ogrzać w dłoni do temperatury ciała.
- W celu aplikacji, konieczne jest delikatne odciągnięcie małżowiny usznej do góry i do tyłu.
- Trzymając buteleczkę w pionowej pozycji, należy przybliżyć końcówkę douszną aplikatora do przewodu słuchowego zewnętrznego i nacisnąć 1 lub 2 razy, by preparat został podany do przewodu słuchowego. Aby uniknąć podrażnień, aplikator nie powinien być wprowadzany do przewodu słuchowego zewnętrznego.
- Należy powtórzyć te czynności dla drugiego ucha.

- Po użyciu, jeżeli końcówka douszna aplikatora miała kontakt z przewodem słuchowym zewnętrznym, można ją opłukać w gorącej wodzie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować przy wyciekach z ucha, podrażnieniu, wysypce w uchu, zawrotach głowy, urazie lub perforacji błony bębenkowej, bólu ucha, założonych rurkach wentylacyjnych w błonie bębenkowej.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.