

Eva/qu czopki przeciw zaparciom x 6 szt



Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	6 szt
Postać	Czopki
Producent	SO.SE.PHARM
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny

Opis produktu

Skład

- Wodorowęglan sodu i winian potasu zawieszono w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie.

Wskazania i działanie

- Czopki Eva/qu® na zasadzie fizjologicznego mechanizmu przywracają prawidłowe wypróżnienie. Po aplikacji polietylenoglikol rozpuszcza się w ciągu 3-4 minut, wywołując reakcję pomiędzy wodą, wodorowęglanem sodu i winianem potasu. W wyniku tej reakcji uwalniany jest CO₂, który rozciąga ściany jelit, umożliwiając wypróżnienie. Reakcja powoduje rozciągnięcie okrężnej mięśniówki gładkiej, w tym wewnętrznego zwieracza odbytu. Rozciąganie mięśniówki wywołuje skurcze, prowadząc do wypróżnienia.
- Produkt nie zaburza równowagi metabolicznej.
- Przy częstym stosowaniu czopki doodbytnicze Eva/qu® powodują również skuteczne defekcje.
- zaparcia związane z wiekiem, ciążą lub laktacją, przewlekłym unieruchomieniem w łóżku, niepełnosprawnością.
- przygotowanie do badania przez odbytnicę (chirurgiczne, gastroenterologiczne, urologiczne)
- retroskopia
- zaparcia związane z podróżowaniem

Dawkowanie

Wyjąć czopek z opakowania bezpośredniego. Zwilżyć wodą i całkowicie wprowadzić do odbytu. Czopek zaczyna się rozpuszczać natychmiast i daje początek bodźcowi stymulującemu wypróżnienie. pomimo, że bodziec wywołujący daje się odczuć zaraz po wprowadzeniu czopka, należy powstrzymać się od wypróżnienia przez kilka minut po wprowadzeniu czopka (zwykle około 5-15 minut). W tym czasie zaleca się chodzić niż siedzieć czy leżeć.

Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań, nawet w przypadku częstego i długiego stosowania. Czopki doodbytnicze Eva/qu® działają tylko miejscowo i

nie zawierają substancji przeczyszczających. Czopki zawierają substancje naturalne, nie toksyczne jak wodorowęglan sodu i winian potasu.

Ostrzeżenia:

Eva/qu® czopki są przeznaczone dla osób dorosłych oraz dzieci od 12-stego roku życia.

Nie stosować w przypadku hemoroidów oraz miejscowych uszkodzeń błony śluzowej.

Stosuje się po jednym lub więcej czopków. Po zastosowaniu może pojawić się uczucie niepełnego wypróżnienia lub niewielkiego przejściowego pieczenia. Te objawy nie powinny powodować obaw i szybko ustępują.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.