

## Ibum forte 400 mg x 36 kaps



Cena: 28,30 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	36 kaps
Postać	Kapsułki
Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

### Opis produktu

#### Wstęp

**Lek Ibum Forte w postaci kapsułek miękkih** z ibuprofenem to środek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym, który przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania.

**Na co jest Ibum Forte? Wskazaniem** do stosowania leku jest ból różnego pochodzenia, którego nasilenie jest słabe do umiarkowanego. **Lek Ibum Forte** może być pomocny przy bólach głowy i zębów, a także przy nerwobólach, dolegliwościach bólowych towarzyszącym infekcjom wirusowym, bólach pourazowych, a oprócz tego bólach mięśniowych i kostno-stawowych. Dodatkowo **lek Ibum Forte** można zastosować przy bolesnym miesiączkowaniu, może być również pomocny przy gorączkach różnego pochodzenia. Substancją czynną leku jest ibuprofen, czyli NLPZ (niesteroidowy lek przeciwzapalny).

W opakowaniu znajduje się 36 **kapsułek miękkih Ibum Forte**. W skład każdej z nich wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki pomocnicze. Produkt należy stosować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i w dawkach nie większych niż zalecane, chyba że lekarz indywidualnie zmodyfikuje dawkowanie danemu pacjentowi. Początkowa dawka leku wynosi 400 mg ibuprofenu, co odpowiada jednej **kapsułce miękkiej Ibum Forte**. Następnie w razie konieczności dopuszczalne jest przyjmowanie kolejnych dawek, zachowując między nimi odstęp minimum 4–6 godzin i nie przekraczając jednocześnie dawki dobowej ibuprofenu, która wynosi 1200 mg, co odpowiada 3 **kapsułkom Ibum Forte**. **Leku** nie powinno się stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 3 dni. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może wiązać się z wystąpieniem objawów przedawkowania lub zatrucia, w tym również ciężkiego zatrucia.

**Lek Ibum Forte w postaci kapsułek miękkih** może także wykazywać **działania niepożądane**. Wśród nich należy wymienić niezbyt często występujące bóle głowy i brzucha, a na dodatek niestrawność i nudności. Możliwe są też objawy skórne, w tym świąd i pokrzywka. Natomiast rzadkie działania niepożądane leku to wzdęcia, biegunka lub zaparcia, a oprócz tego wymioty. Dojść może również do zawrotów głowy, zapalenia śluzówki żołądka, a także drażliwości, pobudzenia i bezsenności oraz do uczucia zmęczenia. Rzadkie działania niepożądane leku to też obrzęki, które mogą być wynikiem zaburzeń pracy nerek i dróg moczowych. Pozostałe **działania niepożądane leku Ibum Forte** wyszczególniono w ulotce.

**Ibum Forte w postaci kapsułek miękkih ma przeciwwskazania** do stosowania. Nie powinien być podawany dzieciom poniżej 12. roku życia. Nie należy go stosować przy nadwrażliwości na ibuprofen lub składniki pomocnicze użyte w recepturze kapsułek, a dodatkowo przy nadwrażliwości na inne NLPZ. Nie zaleca się stosowania leku przy chorobie wrzodowej i perforacji z krwawieniem. Leku nie powinni stosować pacjenci ze skazą krwotoczną i pacjentki w ostatnim trymestrze ciąży. Przeciwwskazaniem jest też jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ oraz ciężka niewydolność wątroby, nerek bądź serca. Należy również uważać na możliwe interakcje ibuprofenu z niektórymi lekami, w tym w szczególności z kwasem acetylosalicylowym, lekami moczopędnymi i na nadciśnienie, a także lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi i kortykosteroidami.

#### Wskazania i działanie

- Bóle o słabym i umiarkowanym nasileniu: głowy (w tym migrenowe), gardła, zębów (również po ekstrakcji zębów i na skutek ząbkowania), mięśni, stawów, pourazowe, pooperacyjne, nerwobóle.
- Bolesne miesiączkowanie
- Stany gorączkowe (m.in przeziębienie, grypa).

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1,5 h. Ibuprofen w 99% wiąże się z białkami osocza. Przenika do jam stawowych, gdzie jego stężenie utrzymuje się stosunkowo długo, nawet po zmniejszeniu stężenia we krwi. Jest metabolizowany w wątrobie.  $T_{0,5}$  we krwi wynosi 2 h. Ibuprofen jest wydalany z moczem w 90% w postaci nieaktywnych metabolitów. Nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie.

#### Skład

Substancja czynna: 1 kaps. elastyczna zawiera 400 mg ibuprofenu.

#### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 200-400 mg ibuprofenu co 4-6 h; maksymalnie 1200 mg/dobę. W reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz zapaleniu kości i stawów: 400-800 mg ibuprofenu 3-4 razy na dobę; maksymalnie 3200 mg/dobę. Kapsułki należy popić szklanką wody.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; Czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; Nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi wystąpiły objawy nadwrażliwości (pokrzywka, katar, napad astmy oskrzelowej) lub wstrząs anafilaktyczny.

#### Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).