

## Ibuprom max 400 mg x 12 tabl drażowanych



Cena: 8,78 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny od ręki
Opakowanie	12 tabl
Postać	Tabletki
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

### Opis produktu

#### Skład

1 tabletkę drażowaną zawiera:

substancje czynne:

ibuprofen 400 mg

substancje pomocnicze:

laktoza, povidon, skrobia kukurydziana, talk, kroscarmeloza sodu, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu koloidalny, sacharoza, dwutlenek tytanu (E171), wosk Carnauba, wosk pszczeli.

#### Wskazania i działanie

IBUPROM® MAX to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu w tym:

- bóle głowy
- migrena
- bóle menstruacyjne
- bóle zębów
- bóle mięśni, kości i stawów
- bóle krzyża
- bóle pourazowe
- nerwobóle
- rwa kulszowa

Lek obniża również gorączkę.

#### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

1 tabletkę co 4 do 6 godzin (nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę).

**Nie należy zażywać leku jeśli:**

wcześniej występowały objawy uczulenia (katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) na kwas acetylosalicylowy, inne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne lub na którykolwiek składnik preparatu. Występuje czynna lub niedawno przeżyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Należy unikać stosowania leku w ciąży zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach.

**Należy zachować szczególną ostrożność stosując IBUPROM® MAX jeśli:**

występuje astma oskrzelowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, niewydolność wątroby i nerek, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi.

**Ciąża:**

przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Pomimo, iż nie wykazano działania teratogennego leku (uszkodzającego płód), należy unikać jego stosowania w ciąży zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach.

**Karmienie piersią:**

przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

brak doniesień dotyczących negatywnego wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

**Stosowanie innych leków:**

leku nie należy stosować z innymi lekami o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. W przypadku równoczesnego leczenia metotreksatem, kortykosteroidami, lekami moczopędnymi, lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi, zidowudyną, bądź lekami wpływającymi na krzepnięcie krwi, przed przyjęciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

**Przechowywanie leku:**

lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej tj. 15°C - 25°C. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. W razie pytań lub wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Działania niepożądane:**

częste (1%-10% pacjentów) – układ pokarmowy: nudności, wymioty, zgaga, niestrawność, wzdęcia, biegunki, zaparcia, ból w nadbrzuszu; układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, nadpobudliwość; skórne reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka; układ krążenia: zatrzymywanie płynów i obrzęki.

nieczęste (0,1%-1% pacjentów) – nadciśnienie, zaburzenia smaku, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT i ALAT.

rzadkie (0,01%-0,1 % pacjentów) – krwawienie z przewodu pokarmowego, nadmierna senność lub bezsenność, zaburzenia krzepnięcia.

bardzo rzadkie (< 0,01% pacjentów) – niewydolność nerek, zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość hemolityczna, granulocytopenia i małopłytkowość.

W przypadku doraźnego stosowania leku działania niepożądane występują rzadko.

U osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, zaburzenia trawienia) lub skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka). Należy wówczas odstawić lek i skontaktować się z lekarzem

**Informacje dodatkowe**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).