

## Ibuprom max sprint 400 mg x 20 kaps



Cena: 15,95 PLN



### Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	20 kaps
Postać	Kapsułki
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

### Opis produktu

#### Wstęp

Lek **Ibuprom Max Sprint** w postaci kapsułek żelowych z ibuprofenem to produkt, który ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Specjalna forma kapsułek żelowych pozwoliła na umieszczenie w produkcie substancji czynnej w formie płynnej. Dzięki temu jej wchłanianie jest szybsze, a w konsekwencji również efekt działania leku jest odczuwalny w krótszym czasie.

**Na co pomaga Ibuprom Max Sprint? Wskazaniem** do stosowania leku są bóle o nasileniu od słabego do umiarkowanego. **Kapsułki żelowe Ibuprom Max Sprint** można stosować w przypadku dolegliwości bólowych o różnej etiologii – w tym przy bólach głowy, mięśni, zębów, kości, stawów czy też przy dolegliwościach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Dodatkowo lek może być stosowany w celach przeciwgorączkowych, a także przeciwzapalnych, jeśli to stan zapalny przyczynia się do dolegliwości bólowych. Składnik czynny leku **Ibuprom Max Sprint**, **ibuprofen**, to NLPZ, który posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

**Działanie leku Ibuprom Max Sprint** opiera się właśnie na tych właściwościach.

W opakowaniu znajduje się **20 kapsułek żelowych Ibuprom Max Sprint**. W skład 1 kapsułki wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki pomocnicze. Zalecane **dawkowanie leku Ibuprom Max Sprint** opisano w dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku leczenia doraźnego należy przyjmować **1 kapsułkę Ibuprom Max Sprint** co 4 godziny, pilnując jednocześnie, aby nie połykać więcej niż 3 kapsułek na dobę. Kapsułki leku powinny być połykane w całości – nie należy ich rozgryzać. Leku nie powinno się łączyć z innymi preparatami działającymi przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, powinien skonsultować się z lekarzem w kwestii ich bezpiecznego łączenia z ibuprofenem.

**Stosowanie leku Ibuprom Max Sprint** może wiązać się z tym, że u pacjenta wystąpią działania niepożądane. Niezbyt często lek powoduje u pacjentów niestrawność, nudności oraz dolegliwości bólowe brzucha. Może też przyczyniać się do wystąpienia dolegliwości bólowych głowy, a oprócz tego może powodować świąd i pokrzywkę. Pozostałe możliwe **działania uboczne leku Ibuprom Max Sprint** opisano w ulotce.

**Przeciwwskazania do stosowania leku Ibuprom Max Sprint** to między innymi nadwrażliwość na ibuprofen lub składniki pomocnicze

kapsułek żelowych. Oprócz tego produkt nie jest zalecany dzieciom w wieku poniżej 12 lat, a także osobom, u których w przeszłości wystąpiły objawy uczulenia po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Produkt nie jest zalecany przy czynnej chorobie wrzodowej i należy unikać jego stosowania w ciąży – w tym szczególnie w jej ostatnim trymestrze. Szczególna ostrożność wymagana jest natomiast przy stosowaniu leku **Ibuprom Max Sprint** przez pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, astmą oskrzelową, zaburzeniami krzepnięcia krwi, czy też nadciśnieniem tętniczym.

#### Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).

#### Galeria

