

Jonolit x 10 sasz smak tutti-frutti



Cena: 16,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	10 sasz.
Postać	Proszki
Producent	OLEOFARM
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

Opis produktu

Składniki

Glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat, substancja przeciwbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja słodząca - sól sodowa sacharyny.

Zawartość w 200 ml przygotowanego płynu:

Glukoza 4g
Cytrynian 379 mg
Chlorki 355 mg
Sodu 276 mg
Potasu 157 mg
Osmolarność roztworu: 251 mOsm/l.

Masa netto

Zawartość w opakowaniu: 10 saszetek
Masa netto: 54 g

Charakterystyka

Jonolit jest preparatem w postaci proszku do przygotowania doustnego płynu nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i zawartości sodu, którego skład zgodny jest z zaleceniami ESPGHAN. W stanach odwodnienia organizmu, niezależnie od ich przyczyny, zaburzeniom ulega równowaga wodno-elektrolitowa. Konieczne jest wtedy uzupełnianie diety w glukozę i minerały podane w odpowiednich proporcjach. Glukoza ułatwia absorpcję jonów sodu w jelicie cienkim. Sód i potas regulują gospodarkę wodną organizmu. Jony cytrynianowe korygują obniżone wskutek odwodnienia pH, zapobiegając nadmiernemu zakwaszeniu organizmu.

Produkt polecany jest:

- do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, w trakcie biegunki i/lub wymiotów.

Dla dzieci powyżej 3-go roku życia i dorosłych.

Stosowanie

Dawkowanie preparatu uzależnione jest od stopnia odwodnienia organizmu, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarskich. Zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF:

Faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania):

- masa ciała 11 – 15,9 kg (wiek: 3 – 4 lata) - zawartość 4-6 saszetek rozpuścić w 800-1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami
- masa ciała 16 – 29,9 kg (wiek: 5 – 14 lat) - zawartość 6-11 saszetek rozpuścić w 1200-2200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami
- masa ciała > 30 kg (wiek: > 15 lat) - zawartość 11-20 saszetek rozpuścić w 2200-4000 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami

Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania):

zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml;
podawać 100 – 200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym;
powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu nawadniającego.

Saszetkę należy otworzyć, a następnie jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem schłodzić. Sporządzonego roztworu nie należy dosładzać. Płyn należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Roztwór nie nadaje się do spożycia po upływie 24 godzin po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywanie

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Występowanie krwi w stolcu, słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Producent

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Informacje dodatkowe

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.