

Lipomal syrop 125 g



Cena: 16,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	125 g
Postać	Syropy
Producent	AFLOFARM
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Tiliae inflorescentia

Opis produktu

Wstęp

Lek **Lipomal w postaci syropu** to produkt stosowany przy objawach przeziębienia, stanach podgorączkowych i stanach zapalnych gardła, który w składzie posiada naturalny składnik – suchy wyciąg z kwiatostanu lipy. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 1. roku życia, a dzięki optymalnej zawartości składników jego stosowanie jest bezpieczne – również przy dłuższej terapii.

Na co jest Lipomal? Wskazaniem do stosowania produktu są stany gorączkowe i zapalne gardła, a oprócz tego kaszel i objawy przeziębienia. W **skład syropu Lipomal** wchodzi suchy wyciąg z kwiatostanu lipy, czyli rośliny, która w medycynie naturalnej stosowana jest nie od dziś. Charakteryzuje się ona wieloma cennymi biologicznie surowcami, w tym związkami flawonoidowymi, olejkami eterycznymi, garbnikami i polifenolami. Lipa działa napotnie, ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne, a dodatkowo działa powlekająco i osłaniająco oraz antyoksydacyjnie. **Funkcją syropu Lipomal** jest zapewnienie najmłodszemu wsparcia przy objawach infekcji górnych dróg oddechowych, w tym przy gorączce, a dodatkowo złagodzenie takich objawów jak stan zapalny gardła czy kaszel.

W opakowaniu znajduje się 125 g syropu wraz z praktyczną miarką, która umożliwi precyzyjne odmierzenie dawki dla dziecka. Na dnie syropu występuje naturalny osad, który jest efektem zawartości składnika naturalnego i jest dopuszczalny – nie jest to objaw złego przechowywania produktu. W skład 5 ml syropu wchodzi 97,089 mg suchego wyciągu z *Tilia cordata* Miller, *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia vulgaris* Heyne bądź ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Wykorzystano tu rozpuszczalnik ekstrakcyjny, jakim jest etanol 40% v/v. W składzie produktu znajdują się również składniki pomocnicze, w tym między innymi 4,03367 g sacharozy, 10,44 mg benzoenu sodu; 9,708 mg glikolu propylenowego oraz glukoza (jako składnik maltodekstryny). Formułę uzupełnia kwas cytrynowy, guma ksantanowa, aromat malinowy AR0320 oraz woda oczyszczona.

Syrop należy dawkować zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku dzieci w wieku 1–3 lat lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Zazwyczaj dawkowanie wynosi wówczas 5 ml 2–3 razy na dobę. Jeśli syrop ma być podawany dzieciom w wieku 3–12 lat, zalecane **dawkowanie leku Lipomal** to 5 ml syropu podawane w częstotliwości 4–5 razy na dobę. Młodzieży w wieku powyżej 12 lat i osobom dorosłym zaleca się natomiast przyjmowanie 10 ml **syropu Lipomal** 3–4 razy na dobę. Syrop przeznaczony jest do podawania doustnego. Nie powinno się stosować dawki leku większej niż zalecana, w tym również przyjmować jego podwójnej porcji.

jeśli przypadkowo doszło do pominięcia wcześniejszej dawki.

Jeśli u pacjenta nie dojdzie do spadku gorączki po 3 dniach lub wręcz temperatura przekroczy 39°C, konieczny jest kontakt z lekarzem. Konsultacja z lekarzem jest także wskazana w przypadku pojawieniu się ropnej wydzieliny, duszności czy innych niepokojących objawów. **Lek Lipomal w postaci syropu** może wykazywać u niektórych pacjentów działania niepożądane. Dotychczas jednak nie stwierdzono żadnych **skutków ubocznych syropu Lipomal**. Jeśli zauważy się objawy mogące stanowić efekt uboczny przyjęcia syropu, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Syrop Lipomal nie powinien być stosowany przez pacjentów mających nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku chęci podania syropu dzieciom w wieku 1–3 lata należy wcześniej skonsultować się z lekarzem. Pacjentki w ciąży lub karmiące piersią także powinny zasięgnąć porady specjalisty przed ewentualnym zastosowaniem produktu. Wcześniejszej konsultacji z lekarzem wymaga również stwierdzona nietolerancja niektórych cukrów.

Lek należy przechowywać w miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla najmłodszych. Optymalną temperaturą przechowywania syropu jest temperatura 25°C. Ważne, by znać podaną na opakowaniu datę ważności leku – gdy upłynie, korzystanie z produktu leczniczego nie jest już możliwe i należy go wyrzucić.

Skład

Substancja czynna: 125 g preparatu Lipomal zawiera 1,86 g suchego wyciągu z kwiatostanu lipy. Preparat Lipomal zawiera nie mniej niż 0,03% flawonoidów w przeliczeniu na rutozyd.

Wskazania i działanie

- Napotne w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom
- Stany zapalne gardła
- Kaszel

Lipomal jest lekiem o naturalnym składzie, w którym dominuje wyciąg z kwiatostanu lipy. Substancja ta jest stosowana tradycyjnie od pokoleń. Posiada działanie przeciwgorączkowe, napotne, niwelujące powikłania uporczywego kaszlu. Ponadto wykazuje delikatne działanie ściągające, powlekające i osłaniające błony śluzowe, dzięki czemu syrop Lipomal łagodzi śluzówkę gardła, chroni ją przed podrażnieniami i stanem zapalnym, a także sprzyja jej regeneracji. Preparat wspiera też układ oddechowy podczas walki z infekcjami oraz wspomaga mechanizmy obronne organizmu.

Wyciąg z kwiatostanu lipy łagodzi napięcie i wykazuje działanie łagodnie uspokajające, dzięki czemu ułatwia zasypianie. Jest to niezwykle istotne przy przechodzeniu infekcji wirusowych i np. uciążliwym, budzącym kaszlu. Preparat Lipomal, poza działaniem leczniczym, wspiera też zdrowy sen - jeden z najlepszych sposobów na regenerację organizmu.

Lipomal - lek idealny również dla dzieci

Dzięki optymalnej zawartości składników Lipomal jest całkowicie bezpieczny, nawet przy długotrwałym stosowaniu. W okresie obniżonej odporności i wzmożonych zachorowań, stanowi idealne rozwiązanie również dla najmłodszych pacjentów. Dodatkowo preparat Lipomal posiada malinowy smak, szczególnie lubiany przez dzieci, oraz wygodną w podawaniu i dawkowaniu postać syropu.

Jak większość preparatów o naturalnym składzie, lek Lipomal powinien być stosowany regularnie i odpowiednio długo. Najlepsze efekty działania preparatu można zauważyć przy stosowaniu go kilka razy w ciągu doby, przez co najmniej kilka dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Preparat pochodzenia naturalnego o działaniu napotnym i przeciwzapalnym.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 łyżka (ok. 10 ml) syropu 3-4 razy dziennie. Dzieci od 4 r.ż.: 1 łyżeczka (5 ml) syropu 4-5 razy dziennie. Dzieci 1-3 r.ż.: zazwyczaj 1 łyżeczka (5 ml) syropu 2-3 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, cukrzyca, nietolerancja fruktozy, upośledzone wchłanianie glukozy i galaktozy, niedobór sacharazy i izomaltazy. W przypadku wystąpienia dolegliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Konieczne będzie dobranie innego leku, np. zamiennika o podobnym działaniu.

Ważne informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań

niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.