

Nailner spray przeciw grzybicy paznokci 8 ml

Cena: 49,00 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------|
| Dostępność | Niedostępny |
| Opakowanie | 8 ml |
| Postać | Aerozole |
| Producent | YOUMEDICAL |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Skład

Mleczan etylu, woda, gliceryna, kwas mlekowy, kwas cytrynowy.

Wskazania i działanie

- Grzybica paznokci to często występującą i przykra dolegliwość, która może powodować dyskomfort i zakłopotanie.
- Nailner Spray jest innowacyjnym i nowym na rynku produktem dostępnym bez recepty. Wykazano, że zawarte substancje czynne są pomocne w zwalczaniu grzybicy paznokci i zapewniają ochronę przed zakażeniem nowo wyrosniętym paznokciem. Preparat Nailner został przebadany klinicznie. Wygodny w użyciu spray umożliwia łatwą i szybką aplikację. Zawartość opakowania wystarcza na około 200 aplikacji. Jedna aplikacja zapewnia dawkę wystarczającą do leczenia paznokcia palucha lub trzech małych palców u nóg.
- Aby cieszyć się pięknymi i zdrowymi paznokciami, stosuj regularnie Nailner Spray, zgodnie z zaleceniami.

Dawkowanie

- Nailner Spray należy stosować dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez co najmniej 4 tygodnie. Po upływie tego okresu aplikacje można ograniczyć do jednej dziennie, do czasu wyrosnięcia zdrowego paznokcia. Należy pokryć całą powierzchnię zakażonych paznokci, rozpylając preparat z odległości 10-15 cm. Aby uniknąć poplamienia, przed zastosowaniem preparatu należy zabezpieczyć powierzchnię pod stopą lub ręką, na którą aplikowany jest spray.
- Po zaaplikowaniu preparatu na paznokcie, należy pozostawić do wyschnięcia na 1-2 minuty przed założeniem skarpety, buta lub rękawiczki.
- Nailner Spray można także stosować **profilaktycznie**. W celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym paznokci należy używać raz dziennie. Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć spray nasadką.

Uwaga

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu preparatu z oczami i/lub

błonami śluzowymi. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej lub podrażnienia należy przerwać stosowanie. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Produkt łatwopalny. Nie wdychać.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.