

## Nifuroksazyd 200 mg x 20 tabl powlekanych (Polfarmex)



Cena: 9,20 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	wysyłamy od ręki
Opakowanie	20 tabl powlekanych
Postać	Tabletki
Producent	POLFARMEX
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Nifuroksazyd

### Opis produktu

#### Skład

Jedna tabletkę powlekana zawiera 200 mg nifuroksazydu (Nifuroksazydum).  
Skrobia ziemniaczana, Powidon K-25, Magnezu stearynian  
Otoczka: Laktoza jednowodna, Hypromeloza 6cP, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, Żółty tlenek żelaza (E 172)

#### Wskazania i działanie

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat (ze względu na postać produktu - tabletkę).

#### Dawkowanie

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 7 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Leku Nifuroksazyd Polfarmex nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

#### Sposób podawania

Produkt stosuje się doustnie. Tabletkę należy połączyć w całości, popijając je odpowiednią ilością płynu (szklanka wody). Tabletkę nie należy przegryzać, ani kruszyć.

#### Działania niepożądane

##### Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje alergiczne np. reakcje skórne; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.

Opisano jeden przypadek świerzbicy guzkowej w przebiegu alergii kontaktowej na nifuroksazyd.

##### Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Opisano jeden przypadek granulocytopenii.

Zaburzenia żołądka i jelit:

W indywidualnych przypadkach nadwrażliwości na nifuroksazyd pojawiają się bóle brzucha, nudności i nasilenie biegunki. W przypadku wystąpienia takich dolegliwości o niewielkim nasileniu nie ma konieczności zastosowania specjalnego leczenia ani przerwania stosowania nifuroksazydu. Jeśli nasilenie dolegliwości jest duże produkt leczniczy należy odstawić. Należy w takim przypadku unikać u chorego kolejnych ekspozycji na pochodne nitrofuranu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko (1/10 000 do <1/1 000) reakcje skórne w postaci wysypki. Opisano jeden przypadek krostowatości u osoby w wieku podeszłym.

**Informacje dodatkowe**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).