

Orocal d3 500 mg+10 mcg x 30 tabl do żucia

Cena: 14,70 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Dostępność | wysyłamy od ręki |
| Opakowanie | 30 tabl do żucia |
| Postać | Tabletki do ssania |
| Producent | NYCOMED PHARMA |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Calcium, Cholecalciferolum |

Opis produktu

Skład

1 tabletkę zawiera 1250 mg węglanu wapnia (ekwiwalent 500 mg wapnia elementarnego) i 400 IU witaminy D3 (ekwiwalent 10ug cholecalciferolu).

Wskazania i działanie

- Niedobór wapnia i witaminy D oraz stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń, np. u osób w podeszłym wieku,
- Profilaktyka osteoporozy,
- Uzupełnienie leczenia podstawowego osteoporozy (np. w leczeniu bisfosfonianami).

Dawkowanie

Stosować doustnie, przeciętnie 1 tabletkę 1-3 razy dziennie w zależności od poziomu niedoboru lub zalecanego dawkowania w ramach farmakologicznego leczenia osteoporozy.

Przeciwwskazania

Hiperkalcemia i nadczynność przytarczyc; hiperkalciuria i kamica nerkowa; przedawkowanie wit.D; nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu. Sporadycznie może pojawić się: hiperkalcemia i hiperkalciuria, zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, biegunka, świąd, wysypka i pokrzywka. Przedawkowanie może spowodować hiperwitaminozę i hiperkalcemię.

Interakcje

Diuretyki tiazydowe, kortykosteroidy, żywice jonowymiennie, środki przeczyszczające, np. olej parafinowy, glikozydy nasercowe, tetracykliny, kwas szczawiowy i fitowy. Wskazane jest przyjmowanie bisfosfonianów i fluorku sodowego co najmniej 3 godziny przed zażyciem preparatu.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.