

Otrivin dla dzieci (0,05%) aerozol do nosa 10 ml



Cena: 21,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozole
Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu

Wstęp

Lek Otrivin dla dzieci w postaci aerozolu do nosa z chlorowodorkiem ksylometazoliny jest produktem przeznaczonym do stosowania u dzieci w wieku 2–11 lat. Efekt działania leku Otrivin dla dzieci pojawia się już po 2 minutach od jego zastosowania i może utrzymywać się nawet przez 12 godzin.

Na co jest Otrivin dla dzieci? Wskazaniem do stosowania leku jest nadmierne przekrwienie śluzówki nosa, które towarzyszy przeziębieniu, zapaleniu zatok, katarowi siennemu czy też alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa. Działanie leku Otrivin dla dzieci polega na ułatwianiu odpływu wydzieliny z zatok przynosowych, a także na redukcji przekrwienia śluzówki. Lek można stosować wspomagająco w przypadku zapalenia ucha środkowego, poza tym ułatwia wziernikowanie nosa. Działanie leku Otrivin dla dzieci polega na obkurczaniu naczyń krwionośnych oraz redukcji przekrwienia i obrzęku śluzówki nosa. **Funkcją leku Otrivin** dla dzieci jest ułatwienie oddychania przez nos, a także zapobieganie wysychaniu i podrażnianiu śluzówki nosa.

W opakowaniu znajduje się 10 ml aerozolu do nosa Otrivin dla dzieci. W **skład** 1 ml produktu wchodzi 0,5 mg chlorowodoru ksylometazoliny oraz składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku u dziecka należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i – jeśli lekarz nie wskaże inaczej – należy postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. **Rekomendowane dawkowanie** Otrivin dla dzieci zależy od wieku dziecka. Dzieciom w wieku 2–5 lat należy podawać 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego w częstotliwości 1–2 razy na dobę (najlepiej co 8–10 godzin), a dzieciom w wieku od 6 do 11 lat 1–2 dawki do każdego otworu nosowego w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Lek powinien być stosowany pod kontrolą dorosłych. Lek nie powinien być stosowany u dzieci dłużej niż 10 kolejnych dni. Jeśli okaże się to niewystarczające do tego, aby objawy ustąpiły, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się też stosowania dawek leku większych niż rekomendowane, gdyż może to prowadzić do nasilenia objawów lub ich powrotu.

Lek Otrivin dla dzieci może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Częste **skutki uboczne** Otrivin dla dzieci to suchość lub podrażnienie śluzówki nosa, ból głowy, nudności lub pieczenie w miejscu podania. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiegokolwiek objawy, które mogłyby stanowić działania niepożądane leku (również takie, które nie są opisane w ulotce) powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie wszyscy pacjenci ze wskazaniami powinni stosować lek Otrivin dla dzieci, gdyż ma on też **przeciwwskazania**. Produkt nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na składnik czynny lub pomocnicze aerozolu. Nie należy korzystać z leku również w przypadku przebytej niedawno operacji przez nos, poza tym przeciwwskazaniem jest wysychające zapalenie błony śluzowej nosa oraz zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Wyrób nie powinien być też stosowany przez pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Skład

Substancja czynna: 1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Wskazania i działanie

- Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
- Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych.
- Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.
- Otrivin dla dzieci ułatwia wzniękowanie nosa.
- Otrivin dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 11 lat.
- Preparat o działaniu sympatykomimetycznym, głównie na receptory α -adrenergiczne. Zastosowany donosowo zwęża rozszerzone naczynia krwionośne błony śluzowej nosogardła, prowadząc do zmniejszenia przekrwienia i objawów stanu zapalnego. Zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, ułatwia drenaż zatok obocznych nosa i oddychanie przez nos, a także zwiększa odpływ wydzieliny. Działanie preparatu rozpoczyna się po kilku minutach od zastosowania i utrzymuje do 10 h. Specjalnie opracowany skład preparatu (formuła nawilżająca) zapobiega wysuszeniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Podanie donosowe:

Dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Nie należy stosować więcej niż 3 x na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 dawka do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8-10 godzin).

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 lub 2 dawki do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin dla dzieci nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przerosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odślonieniem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Galeria

