

Polibiotic (5mg+5000jm+400jm)/g maść 15 g



Cena: 10,65 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|---|
| Dostępność | Produkt dostępny |
| Opakowanie | 15 g |
| Postać | Maści |
| Producent | AFLOFARM |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Bacitracinum, Neomycinum, Polymyxini B sulfas |

Opis produktu

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracyna cynkowa.
 - 1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu, 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej.
- Inny składnik leku to: wazelina biała.

Wskazania i działanie

Lek Polibiotic to maść do stosowania miejscowego na skórę. Substancje czynne leku to antybiotyki – neomycyna, polimyksyna B i bacytracyna, o uzupełniającym się zakresie działania na bakterie, będące przyczyną większości zakażeń skóry.

Lek Polibiotic stosuje się przy drobnych ranach (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach i owrzodzeniach skóry.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polibiotic

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polibiotic (patrz punkt 6),
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia słuchu (lek może mieć działanie uszkodzające słuch),
- na głębokie lub klute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krwi i ich ogólnoustrojowych działań niepożądanych (działanie uszkodzające słuch, nerki),
- do oczu, na błony śluzowe,
- u dzieci w wieku do 12 lat.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek Polibiotic należy nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.

Nie stosować dłużej niż przez 7 dni.

Po ukończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku Polibiotic przed upływem 3 miesięcy.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania uszkodzającego nerki i słuch.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.