

Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml zawiesina 15 ml



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	wysyłamy od ręki
Opakowanie	15 ml
Postać	Zawiesiny
Producent	MEDANA PHARM
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Pyrantelum

Opis produktu

Skład

- Substancją czynną leku jest pyrantel.
 - 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).
- Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70%(E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbitat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelum Medana jest lekiem przeciw pasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pyrantelum Medana:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
- Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych)

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pyrantelum Medana należy omówić to z lekarzem:

- gdy dziecko jest w wieku poniżej 2 lat
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
- jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).

Dawkowanie

Dorośli i dzieci

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11kg to: 11 mg/kg mc. jednorazowo.

Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób stosowania

Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do

uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum Medana

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane:

- nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych•
- alergiczne wysypki skórne•
- bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służmy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.