

Refluxin-M żel x 10 sasz

Cena: 20,00 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	10 sasz
Postać	Żele
Producent	MIRALEX
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wskazania i działanie

- **Refluxin-M®** to żel o unikalnym mechanizmie działania, stosowany w leczeniu refluksu żołądkowego, w celu zmniejszenia związanych z nim objawów, takich jak:
 - zgaga,
 - pieczenie przełyku, również w trakcie ciąży,
 - cofanie się kwasu żołądkowego,
 - słabe trawienie związane z zarzucaniem treści żołądkowej,
 - zapalenia przełyku spowodowane refluksem,
 - kaszel i zapalenie jamy nosowo-gardłowej.
- **Refluxin-M®** może być stosowany z innymi lekami. Jest on dostępny w wygodnych, jednorazowych saszetkach z żelem o przyjemnym, bananowym smaku. Działa już po kilku minutach od użycia.

Skład

- Zawiera naturalne i bezpieczne składniki:
 - **alginian** – związek uzyskiwany z wodorostów, w szczególności z wodorostów brunatnych zwanych „phacophyceae”. Jest dobrze tolerowany, ponieważ jego działanie nie jest zależne od wchłaniania ogólnoustrojowego.
 - **simetikon** - zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu w treści pokarmowej. W ten sposób ułatwia ich pękanie, co usprawnia wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit. Stosowany w leczeniu długotrwałych wzdęć spowodowanych połykaniem powietrza, niestrawności, dyspepsji, wrzodów trawiennych. Simetikon nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany w stanie niezmienionym z kałem.
- **wyciągi naturalnego pochodzenia z wąkroty, aloesu i ślazu** mają działanie naprawcze, ochronne i zmiękczające w odniesieniu do błony śluzowej przełyku oraz samego żołądka.
- **Alginian**, główny składnik **Refluxinu-M®**, działa w sposób mechaniczny przez fizyczne zatrzymanie refluksu - gdy wchodzi on w kontakt z kwasową zawartością żołądka, ma tendencję do formowania pianistego i bardzo lepkiego żelu o małej gęstości. Żel

ten wypływa do górnej części żołądka, spychając jego zawartość na dół. W ten sposób buduje "barierę antyrefluksową" przeciwko fali ciśnienia kwasu i pokarmu na przełyk podczas fazy refluksu. W bardziej poważnych przypadkach zbudowana z alginianuostona, a nie kwaśny pokarm z żołądka, może być zarzucona do przełyku, nie wywołując drażnienia śluzówki. Żel tworzący się z alginianu, dzięki zasadowemu pH oraz poprzez przywieranie do ściany żołądka, chroni jego błonę śluzową.

Dawkowanie

- **Dla kobiet w ciąży** - bardzo częstym zjawiskiem w I trymestrze ciąży są wymioty. Mogą one prowadzić do innego, męczącego problemu, jakim jest zgaga. Długotrwałe utrzymująca się zgaga (pieczenie w przełyku, uczucie bólu w gardle, gorzki smak w ustach) negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i jest problemem, z którym nie wszystkie leki mogą sobie łatwo i bezpiecznie poradzić. Zastosowanie łagodnych preparatów zawierających algi i śluzowe wyciągi roślinne, bardzo szybko likwidują wyżej wymienione objawy, przywracając fizjologiczne pH w gardle i przełyku.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.