

Rivanol 0,1% roztwór 250 g (Prolab)



Cena: 6,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	250 g
Postać	Płynny na skórę
Producent	PROLAB
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ethacridini lactas

Opis produktu

Wstęp

Lek **Rivanol 0,1% od Prolab** w postaci roztworu jest produktem o właściwościach odkażających, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych. **Na co jest Rivanol 0,1% od Prolab? Wskazaniem** do stosowania leku jest odkażanie skóry i błon śluzowych. Wyrób można wykorzystać do dezynfekcji powierzchniowych uszkodzeń skóry. Działanie Rivanol 0,1% od Prolab polega na usuwaniu z powierzchni rany drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym między innymi paciorkowców, gronkowców oraz innych bakterii G-dodatnich.

W opakowaniu znajduje się 250 g **Rivanol 0,1% od Prolab**. **W skład** 1 g płynu do podawania na skórę wchodzi 1 mg etakrydyny mleczanu, a także woda oczyszczona. Produkt należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce lub zaleceniami personelu medycznego. Zazwyczaj należy aplikować roztwór **Rivanol 0,1% od Prolab** na skórę kilka razy w ciągu doby. Produkt można stosować w postaci okładów, płukań bądź przymoczek. Z leku Rivanol 0,1% nie należy jednak korzystać długotrwale, gdyż może wówczas prowadzić do wystąpienia odczynów alergicznych – jest to najbardziej prawdopodobne u wrażliwych pacjentów.

Lek **Rivanol 0,1% od Prolab** może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, ale nie występują one u każdego. U niektórych pacjentów mogą pojawić się odczyny alergiczne związane z zastosowaniem leku. Może być to świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry. W tej sytuacji zaleca się odstawienie produktu i skontaktowanie się z lekarzem. Rzadko u pacjentów pojawia się w związku ze stosowaniem roztworu Rivanol 0,1% kontaktowe zapalenie skóry. Jeśli u pacjenta wystąpią jego objawy, również powinien przestać korzystać z leku i zasięgnąć porady lekarza.

Nie każdy pacjent powinien stosować roztwór **Rivanol 0,1%**. **Przeciwwskazania** obejmują między innymi nadwrażliwość na jego składniki, a także na inne pochodne akrydynowe. Wyrób nie powinien być stosowany u małych dzieci. Jego stosowanie przez kobiety w ciąży i karmiące piersią należy indywidualnie omówić z lekarzem. Produkt leczniczy przeznaczony jest do używania na skórę i błony śluzowe – nie powinien być stosowany doustnie, czy też dojelitowo, poza tym nie należy aplikować go do oczu. Jeśli pacjent omyłkowo wypije lek Rivanol 0,1% od Prolab, należy zapewnić mu opiekę medyczną. Ważne też, aby unikać jakiegokolwiek kontaktu tego leku z oczami. Jeżeli przypadkowo roztwór dostanie się do oczu, zaleca się obfite przepłukanie ich wodą.

Produkt leczniczy Rivanol 0,1% nie powinien być łączony z niektórymi medykamentami, ponieważ może wchodzić z nimi w niekorzystne interakcje. Wśród nich wymienia się inne środki stosowane miejscowo, a także chlorowodorek tetracykliny. Dodatkowo leku nie powinno się łączyć z nadtlenkiem wodoru, nadmanganianem potasu, garbnikami, ani z innymi środkami działającymi utleniająco. Lek nie powinien być też łączony z roztworem boranu sodu, chlorkiem sodu i kwasem salicylowym, ponadto nie zaleca się jego łączenia ze składnikami o charakterze anionowym (np. glikol polietylenowy).

Producent

PROLAB Sp. z o.o.
Paterek, ul. Przemysłowa 3,
89-100 Nakło Nad Notecią

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.