

## Tabex 1,5 mg x 100 tabl powlekanych



Cena: 41,88 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny od ręki
Opakowanie	100 tabl powlekanych
Postać	Tabletki
Producent	SOPHARMA
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Cytisinum

### Opis produktu

#### Wstęp

**Tabex** to lek w postaci tabletek, przeznaczony do leczenia uzależnienia od nikotyny. **Tabex** ułatwia zerwanie z nałogiem palenia papierosów, stopniowo ograniczając zależność funkcjonowania organizmu od nikotyny. Terapia lekiem **Tabex** trwa 25 dni, łagodzi lub całkowicie niweluje efekty odstawienia substancji uzależniającej.

Lek **Tabex** przeznaczony jest dla osób chcących zerwać z nałogiem palenia papierosów i stosowania innych produktów zawierających tytoń lub nikotynę. **Tabex** zawiera cytyzynę, substancję, która działa na organizm podobnie do nikotyny – wpływa na te same receptory, wypierając stopniowo uzależniającą substancję toksyczną. Choć cytyzyna wykazuje bardzo zbliżony do nikotyny efekt farmaceutyczny, sama nie uzależnia! Cytyzyna oddziałuje na układ nerwowy i stymuluje wydzielanie adrenaliny. Dzięki temu **Tabex** zmniejsza zapotrzebowanie organizmu na nikotynę. Lek pozwala na możliwie łagodny przebieg rzucania palenia, bez uciążliwych objawów odstawienia.

Opakowanie leku **Tabex** zawiera 100 tabletek – dokładnie tyle, ile potrzeba do przeprowadzenia pełnego cyklu kuracji.

#### Skład

Jedna tabletki powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.

#### Wskazania i działanie

Lek **Tabex** przeznaczony jest do stosowania w ramach terapii przeciwko uzależnieniu od nikotyny. Opakowanie zawiera 100 tabletek, pozwalając na przeprowadzenie 25. dniowego programu leczenia. **Tabex** pomaga stopniowo odzwyczaić organizm od nikotyny, co oznacza, że na początku terapii, pacjent równocześnie przyjmuje tabletki **Tabex**, nadal paląc papierosy w coraz mniejszej ilości w ciągu dnia. Całkowite zaprzestanie palenia powinno nastąpić najpóźniej 5. dnia terapii. To ważny dla całego przebiegu terapeutycznego moment, warunkujący skuteczność leczenia. W razie niepowodzenia można powtórzyć leczenie po upływie minimum 4 miesięcy.

**Tabex** – leczenie uzależnienia od nikotyny.

- Lek **Tabex** – LECZY uzależnienie od nikotyny w 25 dni

- Pozwala skutecznie zerwać z nałogiem bez efektu odstawienia
- Substancja czynna Leku **Tabex** – alkaloid cytycyna jest pochodzenia naturalnego i nie uzależnia
- Czas leczenia tylko 25 dni
- Niski koszt terapii – wystarczy jedno opakowanie

**Tabex** to preparat ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu. Alkaloid o działaniu zbliżonym do nikotyny pobudza ośrodkowy układ nerwowy – szczególnie ośrodki oddechowy i naczynioruchowy. Cytyzyna wiążąc się z receptorami nikotynewymi, zmniejsza zapotrzebowanie na nikotynę i zapobiega występowaniu objawów głodu nikotynewego.

#### **Tabex i silna wola – recepta na sukces**

Mocne postanowienie rzucenia palenia, przygotowanie psychiczne i świadomość natury przebiegu odstawiania nikotyny, warunkuje skuteczną walkę z nałogiem. Bardzo często silna wola chcącego uwolnić się od papierosów człowieka łamie się, gdy po zaprzestaniu palenia, zaczyna pojawiać się głód nikotynewy z bogatą feerią uciążliwych i przykrych objawów odstawienia. **Tabex**, dzięki zawartości cytyzyny, zwiększa szanse na rzucenie palenia – działając podobnie do nikotyny, łagodzi lub całkowicie wyklucza objawy głodu nikotynewego. **Tabex** (oraz sama cytyzyna) nie powoduje uzależnienia.

W co jeszcze, prócz leku **Tabex**, należy się uzbroić, podejmując walkę z nałogiem:

- spory zasób samokontroli
- wiedzę na temat metod behawioralnych (awersyjnych i pozytywnego wzmocnienia)
- cierpliwość i wyrozumiałość względem siebie.

#### **Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze; niestabilna dławica piersiowa, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, klinicznie istotne zaburzenia rytmu serca, ciąża i karmienie piersią.

#### **Dawkowanie**

Doustnie:

- 1-3 dzień 1 tabl. co 2 h (6 tabl. dziennie);
- 4-12 dzień 1 tabl. co 2,5 h (5 tabl. dziennie),
- 13-16 dzień 1 tabl. co 3 h (4 tabl. dziennie),
- 17-20 dzień 1 tabl. co 5 h (3 tabl. dziennie),
- 21-25 dzień 1-2 tabl. dziennie.

Pacjenci powinni zaprzestać palenia papierosów najpóźniej 5. dnia leczenia. Cykl leczenia można powtórzyć po upływie 4-5 miesięcy.

#### **Informacje dodatkowe**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).