

## Thermo-rheumon krem 50 g

Cena: 31,00 PLN



### Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	50 g
Postać	Kremy
Producent	BAYER
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Benzylii nicotinas, Etofenamatum

### Opis produktu

#### Skład

1 g kremu zawiera 100 mg etofenamatu i 10 mg nikotynianu benzylu.

#### Wskazania i działanie

- Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej; zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgniastych, torebek stawowych); zapalenie nadkłykci.
- Niesteroიდowy lek przeciwzapalny z grupy pochodnych kwasu antranilowego (fenamatów) o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym do stosowania miejscowego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, hamowaniu uwalniania mediatorów zapalenia (bradykininy, serotoniny, histaminy, enzymów proteolitycznych), blokowaniu układu dopełniacza i hamowaniu uwalniania hialuronidazy. Nikotynian benzylu ma właściwości miejscowo drażniące - powoduje miejscowe przekrwienie i uczucie ciepła. Po podaniu na skórę biodostępność wynosi około 20% i zależy od stanu miejscowego (np. wilgotności skóry). Maksymalne stężenie we krwi występuje po 12-24 h od zastosowania. W około 99% wiąże się z białkami osocza. Jest wydalany w postaci wielu metabolitów wolnych lub sprzężonych w 35% z moczem, pozostała część z żółcią i kałem.

#### Dawkowanie

Odpowiednią ilość kremu (zazwyczaj do 2 g, tj. wielkość orzecha laskowego) nałożyć na skórę w okolicy objętej bólem i intensywnie wcierać. Stosować 3-4 razy na dobę. Preparat może być stosowany jako uzupełnienie termoterapii. Leczenie trwa zazwyczaj do 2 tyg.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etofenamát, kwas flufenamowy, nikotynian benzylu lub inne leki z grupy NLPZ. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci do 14 r.ż. Nie stosować na skórę uszkodzoną lub zmienioną chorobowo. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Najczęściej zaczerwienienie skóry i uczucie pieczenia (będące efektem zamierzonym stosowanego leku); bardzo rzadko (<0,01%)

skórne reakcje alergiczne. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

#### **Informacje dodatkowe**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).